



PROGRAM FOLIJARNE ISHRANE JABUKA I KRUŠAKA

1. Zajedno sa herbicidom ili posebno zaliti u tlo: 5 kg/ha **FOLIAREL B** svake 2 godine
2. faza mišjih ušiju: 1 kg/ha **ZINC 25**
3. pred cvatnju 0,75 l/ha **DRIN** + 1 kg/ha **FOLIAREL B**
4. nakon cvatnju 1 kg/ha **FOLIAREL B**
5. od kraja svibnja do tjedan pred berbu – kalcij (**CALCIOGREEN** 4 kg/ha) ili (**CALBORON** 4 kg/ha) ili (**NEWCAL** 5-7 l/ha)
6. 1 x mjesečno **OLIGOGREEN** 1 kg/ha
7. u slučaju slabijeg porasta, a nakon cvatnje **FOLIACON** 22 5 l/ha
8. nakon 15.07. **HASCON M 10AD** – 5 l/ha, 3 x, svakih 15 dana, izmjenjuje se sa kalcijem
9. nakon berbe 1 kg/ha **ZINC 25** + 2 kg/ha **FOLIAREL B**
10. u slučaju pojave bilo koje stresne situacije (mraz, tuča, suša, bolest itd.) koristimo u bilo kojoj fazi DRIN u količini 0,5-1 l/ha
11. potapanje plodova nakon berbe, za bolje skladištenje – **CALCIOGREEN** 3,5 – 4 kg/1000 l vode ili **CALBORON** 3,5-4 kg/1000 l vode ili **NEWCAL** 10-20 l/1000 l vode u slučaju bilo koje stresne situacije čim prije upotrijebimo DRIN u količini od 500-1000 ml/ha